



PROCÉDURE  
**BRANCHEMENT A DOMICILE D'UNE NUTRITION PARENTERALE  
CYCLISEE SUR UN CATHETER LONGUE DUREE AVEC  
TAUROLIDINE**

Page 1 sur 3

<b><u>REDACTION</u></b>	<b><u>VERIFICATION</u></b>	<b><u>APPROBATION</u></b>
NOM : Verheaghe Laurie, Chambonneau Caroline Fonction : IDE Coordinateurs NPAD Visa :	NOM : Dr Lescut Dominique Fonction : Médecin Visa :	NOM : Pr Seguy David Fonction : Médecin Visa :

**Objet**

***Cette procédure a pour objet de préciser les modalités de branchement d'une nutrition parentérale cyclisée sur un cathéter longue durée (Nutricath, Broviac, PAC, Picc line) par l'infirmière libérale (Cf : Recommandation concernant la NPAD).***

<b>Activité</b>	<b>Responsable</b>	<b>Description des tâches</b>
<b>MATERIEL</b>	<b>IDE libérale et IDE secteurs de soins</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 masques</li><li>• 2 charlottes</li><li>• 1 surblouse</li><li>• 1 rouleau de leuco</li><li>• 1 paire de gants stériles</li><li>• 1 paquet de compresses stériles</li><li>• 1 flacon de biseptine (ouvert depuis moins de 1 mois)</li><li>• 1 flacon de solution hydro alcoolique (ouvert depuis moins de 1 mois)</li><li>• 1 blister branchement</li><li>• 1 carton à déchets à risque et 1 sac poubelle</li><li>• 1 poche de nutrition sortie depuis plus de 3h</li><li>• 1 prolongateur muni d'un auto-flush</li><li>• 1 ampoule de NAACL 0.9% 10ml</li></ul>
<b>TECHNIQUE</b>	<b>IDE libérale et IDE secteurs de soins</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de travail propre</li><li>• Patient allongé, masqué, mains lavées.</li><li>• Mettre le masque et la charlotte.</li><li>• Réaliser un lavage des mains hygiénique. (2 minutes)</li><li>• Mettre la surblouse.</li><li>• Mettre de la biseptine sur les compresses.</li><li>• Déballer et protéger l'extrémité de la tubulure avec les compresses avant de l'installer dans la pompe.</li><li>• Programmer la pompe et purger la tubulure.</li><li>• Réaliser une désinfection des mains.</li><li>• Ouvrir le blister. (cf composition pour les ide des secteurs de soins)</li><li>• Déplier le champ stérile et le poser sur le patient.</li><li>• Retirer feuille séparatrice.</li><li>• Mettre de la biseptine sur les compresses stériles du set.</li></ul>



PROCÉDURE

**BRANCHEMENT A DOMICILE D'UNE NUTRITION PARENTERALE  
CYCLISEE SUR UN CATHETER LONGUE DUREE AVEC  
TAUROLIDINE**

Page 2 sur 3

- Enlever le papier du paquet de compresses de l'extrémité de la tubulure et la poser sur le champ stérile.
- Mettre les gants stériles.
- Préparer la seringue de rinçage.
- Purger avec du NAACL 0.9% le prolongateur muni de l'auto-flush (seulement lors de la réfection du pansement du cathéter longue durée)
- Saisir le cathéter à l'aide d'une compresse.
- Retirer 3 ml de Taurolidine.
- Rincer de manière pulsée le cathéter avec la seringue préalablement remplie
- Saisir la tubulure à l'aide d'une compresse.
- Adapter la tubulure sur le prolongateur muni de l'auto-flush.
- Déclamper la tubulure. Mettre en route la pompe.
- Nettoyer le plan de travail et ranger le matériel.

## Attention

**Le Broviac, le Picc-line et le PAC n'ont pas de prolongateur auto-flush. Par conséquent pensez à clamper votre cathéter lors des différentes manipulations, et le déclamper lors de la mise en route de la nutrition.**

**Pour le Nutricath, toujours vérifier la présence effective de 2 fils d'attache distincts à la peau.**

