



PROCÉDURE
DEBRANCHEMENT A DOMICILE D'UNE NUTRITION
PARENTERALE CYCLISEE SUR UN CATHETER LONGUE
DUREE AVEC TAUROLIDINE

Page 1 sur 3

<u>REDACTION</u>	<u>VERIFICATION</u>	<u>APPROBATION</u>
NOM : Verheaghe Laurie, Chambonneau Caroline Fonction : IDE Coordinateurs NPAD Visa :	NOM : Dr Lescut Dominique Fonction : Médecin Visa :	NOM : Pr Seguy David Fonction : Médecin Visa :

Objet

Cette procédure a pour objet de préciser les modalités de débranchement d'une nutrition parentérale cyclisée sur un cathéter longue durée (Nutricath, Broviac, PAC, Picc line) par une infirmière libérale (Cf : Recommandation concernant la NPAD).

Activité	Responsable	Description des tâches
MATERIEL	IDE libérale et ide des secteurs de soins	• 2 masques • 2 charlottes • 1 surblouse • 1 rouleau de leuco • 1 paire de gants stériles • 1 flacon de biseptine (ouvert depuis moins de 1 mois) • 1 flacon de solution hydro alcoolique (ouvert depuis moins de 1 mois) • 1 blister débranchement • 1 carton à déchets à risque et 1 sac poubelle • 1 ampoule de 3 ml de taurolidine
LA TECHNIQUE	IDE libérale et IDE des secteurs de soins	• Plan de travail propre • Patient allongé, masqué, mains lavées. • Réaliser un lavage des mains hygiénique. (2 minutes) • Mettre le masque et la charlotte. • Mettre la surblouse. • Réaliser une désinfection des mains. • Ouvrir le blister. (cf set de composition pour les ide des secteurs de soins) • Déplier le champ stérile et le poser sur le patient. • Retirer feuille séparatrice. • Ouvrir le paquet de compresses stérile sur le champ. • Mettre de la biseptine sur les compresses stériles du set. • Casser l'ampoule de Taurolidine • Réaliser une désinfection des mains • Mettre les gants stériles. • Préparer la seringue de rinçage • Prélever 3 ml de Taurolidine à l'aide de la seringue de 10 ml en saisissant l'ampoule à l'aide d'une compresse



PROCÉDURE

DEBRANCHEMENT A DOMICILE D'UNE NUTRITION PARENTERALE CYCLISEE SUR UN CATHETER LONGUE DUREE AVEC TAUROLIDINE

Page 2 sur 3

stérile

- Enlever la tubulure de nutrition à l'aide d'une compresse.
- Adapter la seringue de 20 cc de NACL 0.9% au prolongateur muni de l'auto-flush.
- Rincer de manière pulsée le cathéter.
- Retirer la seringue.
- Adapter la seringue contenant la taurolodine et injecter les 3 ml
- Nettoyer le plan de travail et ranger le matériel.
- Mettre la pompe en charge.

Attention

Le Broviac, le Picc-line et le PAC n'ont pas de prolongateur auto-flush. Par conséquent pensez à clamber votre cathéter lors des différentes manipulations, et le déclamber lors de la mise en route de la nutrition.

Pour le Nutricath, toujours vérifier la présence effective de 2 fils d'attache distincts à la peau

